


預防工作時暑熱的疾病。

戶外與室內高溫暴露都可能很危險。

自我保護與保護他人的方法

舒緩的進入工作狀態。開工的第一個禮拜就會有將近四分之三的死亡是因暑熱疾病所導致。



- ✓ 新聘員工和返崗職員需要建立耐熱性(適應環境)並勤密的小休。
- ✓ 應遵循20%原則。工作的第一天,高溫天氣竭力勞動不超過班時數的百分之20。然後照一天不超過20%的竭力勞動時長狀況直到僱員們適應高溫天氣勞動。



清涼飲用水

即便您不覺得到口渴,也請飲用清涼的水,至少每20分鐘一杯。



防暑衣著

戴好帽子,盡可能穿著淺色、鬆身以及通爽的衣物。



採取休憩

根據氣溫、濕度和環境情況,確保用充沛的時間達到降溫效果。



同事間互相關注

監測您自己和他人暑熱的疾病症狀。



尋找有遮蔽和陰涼的地方

在指定的有遮蔽和陰涼處的地方休息。



戴面罩時,

如果面罩變濕或弄髒,請及時更換。經常互相口頭詢問狀況。

暑熱疾病急救

緊急就醫症狀如下!



- 思維或行為失常
- 口齒不清
- ●癲癇
- 喪失意識
- 1)>>
- 立即致電911
- 2
- 在動脈位置放置冰袋進行降溫(頸兩側、腋下、大腿近骨盆的位置、後腳踝)
- **(3**)»
- 陪伴在工人身邊直到救護人員到達



注意觀察任何其他的暑熱疾病症狀並迅速採取行動。有疑問時請致電911。

如果工人出現以下徵狀:

頭痛或惡心

虚弱或眩暈

暴汗·皮表溫感熱及乾燥 體溫異常高

口渴

排尿量減少



請採取以下措施:

- >> 讓工人飲用含有盐分的凉水
- 》脫下不必要的衣物
- 》移到涼爽的區域
- 》利用水、冰塊或風扇降溫
- 》不要獨自離開患者
- 》尋求醫療幫助





更多資訊: 1-800-321-OSHA (6742)